

舒暢胃部的綠色胃藥

爽胃王[®]—加 顆粒

NEW- Saclon plus granules

衛署藥製字第033444號

使用時，請務必閱讀本說明書。
請小心保管以方便必要時可即時閱讀。

「爽胃王[®]-加」是以安定化的葉綠素(Sodium copper chlorophyllin)為主成分的綠色胃藥。

「爽胃王[®]-加」有制酸劑Polymigel、Synthetic hydrotalcite及Sodium bicarbonate，再加上具有緩和胃神經緊張、抑制胃酸分泌過多之Scopolia extract powder等成分，可以改善胃痛、胃酸過多、胃灼熱感、嘔吐感等症狀。此外，因有Dimethylpolysiloxane之配方，對胃腸內氣體所引起之脹氣、膨脹感，有改善效果。「爽胃王[®]-加」在睡前空腹時服用更具有效果。主成分Sodium copper chlorophyllin能直接作用於受損之胃黏膜組織。

胃悶或胸口有灼熱感時，可能是因為胃酸過多所引起。飲酒過度，酒精直接刺激胃壁黏膜也可能造成這些現象。

「爽胃王[®]-加」能緩和分泌過量的胃液作用（中和），抑制分泌，以葉綠素所製造的綠色成分修復、保護胃壁黏膜。

胃悶、胸口灼熱、飲酒過度時，服用「爽胃王[®]-加」能讓胃部舒暢。

【成分】(1 g)

Polymigel	269.2 mg
Synthetic hydrotalcite	230.8 mg
Sodium bicarbonate	146.2 mg
Dimethylpolysiloxane	15.4 mg
Sodium copper chlorophyllin	23.1 mg
Scopolia extract powder	76.9 mg

賦形劑包括: povidone、soluble starch、corn starch、cinnamon powder、menthol、SCS flavor。

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。

解除脹氣、緩解脹氣相關症狀。

【用法用量】

成人(15歲以上)1次1包，小孩(8歲以上~未滿15歲)1次1/2包，1日3次，每餐之間及睡前空腹時服用。醫師、藥師、藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 禁止事項(如不遵守將造成目前的症狀惡化，容易引發副作用)
 - (1) 服用本品期間，請勿服用以下藥物：腸胃鎮痛解痙劑。
 - (2) 授乳期間請勿服用本品，若服用本品請停止授乳（藥物透過母乳可能造成嬰兒脈搏加速）。
6. 以下情況請洽詢醫師、藥師或藥劑生使用：
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 孕婦或可能懷孕者
 - (3) 高齡者

- (4) 可能因為藥物引發過敏症狀者
 - (5) 有以下症狀者: 排尿困難
 - (6) 正在接受以下診斷者: 腎臟病、心臟病、綠內障(青光眼)、甲狀腺機能障礙
7. 服用後如出現以下症狀可能係副作用所造成, 請立即停止服用並攜帶本說明書洽詢醫師、藥師或藥劑生。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

- 8. 服用後可能出現以下症狀: 口乾舌燥、便秘、下痢。若症狀持續或增強, 請停止服用並攜帶本說明書洽詢醫師、藥師或藥劑生。
- 9. 服用兩週後症狀仍未改善時, 請停止服用並攜帶本說明書洽詢醫師、藥師或藥劑生。
- 10. 其他注意事項: 可能會造成母乳分泌減少。
- 11. 請勿將本品移裝到其他容器。此外, 本容器內請勿放入其他藥品(可能造成誤用或品質變質)。
- 12. 若將1包分成兩次使用時, 剩餘的藥品請將袋口折疊以妥善保管。若放置超過兩日, 即請勿服用。
- 13. 超過保存期限, 請勿服用。

【警語】

- 1. 請遵循醫師、藥師、藥劑生指示。
 - (1) 未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (2) 一天內不可服用超過一日最大劑量, 也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (3) 制酸劑不得併用其他藥品。
- 2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感, 應先就醫確定診斷後再行服用。
- 3. 消化道潰瘍患者應先就醫, 不要自行服藥。
- 4. 本品含鋁之制酸成分可能會引起便秘, 偶有噁心、嘔吐。
- 5. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥, 可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis Encephalopathy)及低磷血症, 應謹慎小心使用。
- 6. 本品含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。
- 7. 本品含鈣之制酸成分, 可能引起便秘或腹瀉; 長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 8. 本品含碳酸氫鈉會引起腹脹、打嗝; 如長期與鈣質牛奶併用, 會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象; 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒; 會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫之患者禁止使用。

【包裝】

爽胃王®-加顆粒 6~100包盒裝

製造廠: 保瑞藥業股份有限公司
 台南市官田區工業西路54號



委託者: 衛采製藥股份有限公司
 台北市長安東路一段18號9樓

修訂版本日期: June 20, 2013
 Based on Japanese PI (Version: August 2012)